# AREAS PROTEGIDAS DE BOLIVIA



# AREAS PROTEGIDAS DE BOLIVIA

## 1 Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado SERRANÍA DEL AGUARAGÜE

El PN ANMI Serranía del Aguaragüe se encuentra ubicado al Este del Departamento de Tarija, en la Provincia Gran Chaco. Abarca amplias zonas de los municipios de Villa Montes, Caraparí y Yacuiba. El Área se inicia en el paralelo 22º en el límite de la frontera con la República de Argentina, hasta el límite Norte del Departamento de Tarija con Chuquisaca. Tiene 10 km de ancho y 111 km de largo. Cubre una superficie total de 108.307 ha (1.083 km²). El clima es subhúmedo megatermal en la zona de pie de monte y en la parte Norte de la tipo subandina. La región presenta temperaturas moderadas en verano, con una media anual en esa época de 21.5ºC. El rango altitudinal del Área oscila entre los 1.900 y 750 msnm. Forma parte de la Vertiente Oriental Andina y Subandina. Abarca las ecoregiones del Bosque Subhúmedo Submontano y del Bosque Deciduo del Chaco Serrano. El Bosque Chaqueño boliviano y el Bosque Serrano Chaqueño se hallan ampliamente representados en diferentes zonas del Área.

El primer ecosistema se caracteriza por un bosque semi-siempre verde en el que se encuentran especies típicas de Yungas, y es un ecosistema muy rico en Lauraceae y Myrtaceae. Entre las especies más representativas de flora se encuentran: el pino de cerro, barroso, guayabillo, cedro, nogal, sauco, varias especies de laurel, arbolito y la caña brava. El Bosque Serrano Chaqueño está ubicado en la zona de media a la serranía y se caracteriza por ser un bosque xerófilo caducifolio. Cuenta con especies típicas de la provincia Chaqueña, como: horco quebracho, quebracho colorado, quebracho blanco, urundel, mistol, cebil, tabonoh y varias especies de cactus. La fauna esta caracterizada por una alta diversidad de elementos del Chaco con especies como el oso hormiguero, oso melero, dos conuelas, tejón, zorro, tigre o jaguar, gatos menores, chaireta, chuña y las pavas de monte. En la provincia de Bosque Serrano Chaqueño, las especies más representativas son: el quirquincho bola, peludo, mulita, chancho de monte, jecari de collar, oso melero y el oso bandera. En el interior del PN ANMI Serranía del Aguaragüe existen 30 comunidades indígenas que están ubicadas en la zona catalogada como ANMI dentro del Área. La población total que vive dentro del ANMI es de cerca de 10.201 habitantes y pertenecen al grupo étnico Weenhayek al Este y al grupo Tëkuguasu al Oeste.

## 2 Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado AMBORÓ

El PN ANMI Amboró presenta una gran belleza escénica por el relieve montañoso, los cañones y valles profundos, los ríos torrentosos y las caídas de agua. Se caracteriza por una gran diversidad de ecosistemas de montaña húmeda. Se localiza al Oeste del Departamento de Santa Cruz, entre las Provincias Ichilo, Manuel María Caballero, Florida y Andrés Ibañez En la zona de amortiguación externa Sur están las ruinas arqueológicas de Samaipata (Fuerte de Samaipata) y las pictografías del Tunal. Circundantes al Área existen poblaciones pintorescas como Samaipata, Comarapa y Buena Vista. Los municipios involucrados son: Buenavista, San Carlos, Yapacaní, Comarapa, Samaipata, Mairana, Pampa Grande, El Torno y Porongo.

La superficie actual es de 637.600 ha (6.376 km²), correspondiendo 442.500 ha a la categoría de PN y 195.100 ha a la de ANMI. El clima es templado en la parte alta y cálido en las zonas más bajas. La precipitación varía según las zonas entre 1.400 a 4.000 mm anuales. El rango altitudinal oscila entre los 3.300 y 300 msnm. El Área está ubicada en el denominado "Codo de los Andes" o región Subandina del Departamento de Santa Cruz, donde la Cordillera cambia de rumbo hacia el Sur. La región es típicamente montañosa, con fuertes pendientes y pronunciadas diferencias de nivel. La zona Sur tiene una topografía de colinas bajas. Biogeográficamente corresponde a la subregión Bosque Húmedo Montañoso de Yungas. Respecto a la flora se encuentran registradas 2.659 especies de plantas superiores, sin embargo se estima la existencia de más de 3.500 especies, entre ellas destacan el linaciho, sibello, sheilu, cebillo, iziqo, bilka, bibosi, amboaba uva, pacay, guitarrero, dizeo rojo, mara, pinos de monte, nogal y el canelón. Es de enorme relevancia la presencia de extensas manchas de helechos arbóreos gigantes en los Bosques Nublados. Además se encuentran las palmas pachiuva y el asai y varias especies de orquídeas endémicas. Alrededor de 1.236 especies de fauna, entre las cuales destacan el jucumari o oso de anteojos, jaguar, oso bandera, pava de copete, paraba militar, paraba frente roja y varias especies de aves endémicas. El patrón de asentamiento de la población se caracteriza por ser periférico. Las comunidades y asentamientos se concentran en los bordes Norte y Sur del ANMI, con escasa población hacia el centro.

## 3 Área Natural de Manejo Integrado Nacional APOLOBAMBA

Ubicada en el extremo Oeste del Departamento de La Paz, en las Provincias Bautista Saavedra, Franz Tamayo y Larecaja. Los municipios involucrados son Ixiamas, Curva, Charazani y Guanay. Tiene una posición fronteriza con el Perú. Su superficie es de 483.743,80 ha (4.837 km²). Posee una gran belleza escénica debido principalmente a los imponentes nevados como el Akamani, Presidente y Katantika, lagunas de origen glacial e impresionantes glaciares como el Chacal Orcko que es uno de los más grandes del mundo. Se destacan los ambientes nivales y periglaciales de la Cordillera Real, la Pradera Alhuendina Huañedia, bofedales y turberas, el Páramo Yungueño, el Bosque Nublado de Ceja y relictos de bosques de queñua. Existen además aguas termales y rutas de ascenso para andinismo, así como ríos torrentosos de montaña. El clima es muy frío en la región cordillerana y las mesetas del occidente (promedio anual de temperatura de 4.9ºC). Hay un verano templado en la zona de puna (promedio de 10ºC), y templado (promedio de 19ºC) hasta cálido en la zona de Yungas (promedio de 26ºC).La precipitación anual fluctúa entre los 300 y 1.900 mm anuales según la zona y vertiente de exposición.

El rango altitudinal oscila entre los 6.200 y 800 msnm. Ocupa la región cordillerana de Apolobamba, extendiéndose hasta la región montañosa húmeda de la ceja de montaña y Yungas de Carijana. La geomorfología está caracterizada por los relevés cordilleranos, con fuertes pendientes y pronunciadas diferencias de nivel. La Reserva está incluida biogeográficamente en la subregiones Altoandina, Puna y Bosque Húmedo Montañoso de Yungas. Se tienen registradas 807 especies de flora. La vegetación del piso Altoandino se caracteriza por una pradera de bajo porte, donde predominan gramíneas duras y stilifoladas, plantas en roseta, rastreras y en cojines compactos como: kauello, wikumilla, yareta y el orequilla, y pulvinulos de bofedales. Entre la flora del Bosque Nublado destacan especies emenazadas como: queñua, nogal, pino de monte, aliso, chachacoani, laurel colorado, guayabillo, amayán, limacho, cori cori, sauco, caribo santo, colorado del monte, quina, quina quina, iziqo o colorado y la bilka. En recursos de fauna se tienen registradas 275 especies entre las que destacan: la vicuña especie de que se tiene las mayores poblaciones naturales del país. También destaca el jucumari, taruca o venado andino, ciervo, venado pelaeo, gato andino o titi, puma, choca grande, huaitata y el pato de torrentes. El patrón de asentamiento de la población es disperso principalmente a lo largo de los principales valles interiores pertenecientes al grupo étnico de los quechuas.

## 4 Parque Nacional CARRASCO

Está ubicado al Este del Departamento de Cochabamba, en las provincias Carrasco, Tiraque y Chapare. Los municipios involucrados son respectivamente: Puerto Villarroel, Chimoré, Totora, Pocona, Pojo, Tiraque, Villa Tunari y Colomi. Tiene una superficie de 622.600 ha (6.226 km2). El PN Carrasco presenta una gran belleza escénica caracterizada por el relieve montañoso con cañones y valles profundos, ríos torrentosos, caídas de agua y una exuberante vegetación. Dentro del Área está ubicado el Santuario de Vida Silvestre Cavernas del Repechón, que constituye un importante sitio de anidación y concentración de poblaciones de guácharos, especie de ave nocturna muy particular y amenazada. El clima es frío a templado en las tierras altas del Sur hasta cálido en las partes bajas del Norte. Gran parte del Área se caracteriza por la ocurrencia de lluvias con extremos de precipitación que pueden superar los 5.000 mm anuales. El rango altitudinal oscila entre los 4.700 y 300 msnm.

El Área está ubicada en la región Cordillerana y Subandina tiene una fisiografía montañosa de profundos valles y pronunciadas pendientes. En la región Norte el relieve predominando se caracteriza por sus cumbres. Biogeográficamente se ubica mayormente en las subregiones Altoandina, Puna y Yungas Montañosos. Entre la flora del Bosque Nublado destacan especies emenazadas como: queñua, nogal, pino de monte, alisos, chachacoani, laurel colorado, guayabillo, amayán, limacho, cori cori, sauco, caribo santo, colorado del monte, quina, quina quina, iziqo o colorado y la bilka. En recursos de fauna se tienen registradas 275 especies entre las que destacan: la vicuña especie de que se tiene las mayores poblaciones naturales del país. También destaca el jucumari, taruca o venado andino, ciervo, venado pelaeo, gato andino o titi, puma, choca grande, huaitata y el pato de torrentes. El patrón de asentamiento de la población es disperso principalmente a lo largo de los principales valles interiores pertenecientes al grupo étnico de los quechuas.

## 5 Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado COTAPATA

Se encuentra al Noreste de la ciudad de La Paz aproximadamente a 20 km, y adosada al mismo cordillerano. Presenta una gran diversidad de ecosistemas en virtud al gradiente altitudinal, incluye altas cordilleras y campos de nieve, ambientes periglaciales, Pradera Altoandina, bofedales y turberas, Páramo Yungueño, Bosque Nublado Pluvial de Ceja de Montaña y Bosque Húmedo Bajomontano de Yungas, uno de sus mayores valores es el camino precolombino del Chuquiago Chono o "Camino del Inca" que cruza el Área desde la región de Cordillera hasta los Yungas cálidos del río Inca. El clima varía según el gradiente altitudinal de frío en las alturas hasta templado cálido hacia el límite inferior. La precipitación fluctúa entre 600 mm en la parte alta hasta más de 3.000 mm en el Bosque Nublado de Ceja.

El rango altitudinal oscila entre los 5.900 y 1.000 msnm. Fisiográficamente, comprende partes de la Cordillera Real, algunas cordilleras menores y estribaciones cordilleranas con relieve abrupto, profundos cañones, crestas y filas de mesetas en la parte alta. Hay alrededor de 620 especies registradas de flora y se estima la existencia de 800 especies de plantas superiores, sin embargo se estima la existencia de más de 3.500 especies, entre ellas destacan el linaciho, sibello, sheilu, cebillo, iziqo, bilka, bibosi, amboaba uva, pacay, guitarrero, dizeo rojo, mara, pinos de monte, nogal y el canelón. Es de enorme relevancia la presencia de extensas manchas de helechos arbóreos gigantes en los Bosques Nublados. Además se encuentran las palmas pachiuva y el asai y varias especies de orquídeas endémicas. Alrededor de 1.236 especies de fauna, entre las cuales destacan el jucumari o oso de anteojos, jaguar, oso bandera, pava de copete, paraba militar, paraba frente roja y varias especies de aves endémicas. El patrón de asentamiento de la población se caracteriza por ser periférico. Las comunidades y asentamientos se concentran en los bordes Norte y Sur del ANMI, con escasa población hacia el centro.

## 6 Reserva Nacional de Fauna Andina EDUARDO AVAROA (REA)




Está ubicada en el extremo Sur del Departamento de Potosí, en la Provincia Sud Lípez, en el municipio de San Pablo de Lípez. El Área colinda hacia el Sur con la República Argentina y al Oeste con la República de Chile. Tiene una superficie de 714.745 ha (7.147 km2). La REA tiene una excepcional belleza escénica, por lo que se constituye en uno de los centros más importantes de atracción turística de Bolivia. Exotiquamente se caracteriza por los extensos desiertos helados y la Pradera Altoandina Semidesértica. Existen además lagunas saladas de origen glacial, bofedales y turbinas. Entre las lagunas se destacan Laguna Colorada (que es Sitio RAMSAR) y Laguna Verde. Las enormes colonias de animales de flamencos constituyen otro de los principales atractivos de la REA. Además resaltan los extraños paisajes y formaciones edíticas sobre rocas basálticas e ignimbritas, los gigantescos volcanes, las aguas termales heladas y las tres especies de flamencos que nidifican en enormes colonias.

La REA ocupa casi el 40% del territorio del municipio de San Pablo de Lípez, cuya población es de sólo 2.412 habitantes y se concentra principalmente en la región Norteste. Al interior de la REA se estima la presencia de unas 100 familias, con 605 habitantes.

## 7 Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni

La EBB ocupa el Sudoeste del Departamento del Beni, entre las Provincias Yacuma y Ballivián. Los municipios involucrados son San Borja y Santa Ana del Yacuma. La superficie es de 135.000 ha (1.350 km²). El clima es cálido tropical con lluvias de verano.

La precipitación anual oscila entre los 1.400 mm en los años más secos hasta los 3.000 mm en los más húmedos. La temperatura media es de 22º mmm. La topografía es esencialmente plana con escasas diferencias de relieve en grandes extensiones.

El área tiene una coadministración con la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia (ANCB). Tiene una típica posición biogeográfica insular, es decir que es un archipiélago de bosques aluviales rodeados de sabanas y humedales. Se encuentra en la subregión biogeográfica del Bosque Húmedo Cedo. Se encuentran 815 especies registradas de plantas superiores registradas, estimándose la existencia de hasta 1.500 especies. Entre la flora destacan especies como la mara, palo maría, cedro, ochoó, tajibo morado, cuchi, palma pachiuva y la jatata. La vegetación constituye un intrincado mosaico de bosques, humedales y sabanas. Se registraron 852 especies de fauna. De importancia son el pejichi, marimono, manechi, jaguar, ciervo de los pantanos, águila harpía, pato negro, peta de río, lagarto y el caimán negro. Hasta el momento se identificaron 480 especies de aves. La población es principalmente Chimane y Cambia. También existen núcleos étnicos Movima en la zona Norte.

## 8 Área Natural de Manejo Integrado EL PALMAR

Está ubicada en el Departamento de Chuquisaca, en la Provincia Zudáñez. El municipio involucrado es Presto. Tiene una superficie de 59.484 ha (595 km²). El clima es templado (mesotérmico), niveles de precipitación anual promedio de 314 mm. El rango altitudinal oscila entre los 1.000 y 3.200 msnm. La geografía del Área corresponde a una parte de la Cordillera Oriental. La región es típicamente montañosa con profundos cañones. Ocupa la región de Valles Secos Mesotérmicos, teniendo selva húmeda montañosa en las cabeceras del río Pilcomayo. En el Área existen 270 especies de plantas superiores, cuatro de ellas especies endémicas. Presencia la asociación vegetal del soto, sotomara, chari, k'acha k'acha, willca y numerosas acacias espinosas. En las cercanías de los ríos se encuentran el algarrobo, el munchuelo, el bandoy y el salajchi. Entre 2.000 a 2.500 msnm, la vegetación dominante en arbustos es dada por la presencia de chacalera, thola y thollilla. Entre 2.600 a 3.200 msnm se encuentra la Sub-puna con presencia de la asociación de kewiña, alisu y sahuinto.

Las manchas de palmares de la especie Parajubaea torallyi empiezan aproximadamente a los 2.400 msnm y se extienden hasta los 3.200 msnm y se encuentran preferentemente en las quebradas ocupando una superficie aproximada de 34 km². Se tienen registradas 24 especies de mamíferos, de las cuales seis están en las listas de CITES: el oso de anteojos, el puma, gato andino o de pajonal o titi, monte k'uchi o chancho de monte y la urina. Se tienen registradas 112 especies de aves pertenecientes a 30 familias. Destacan el cóndor, pava de monte, tipcua y los pájaros carpinteros (5 especies) y ocho especies de loros. Además, se identificaron seis especies de anfibios, cinco de lagartijas y seis de serpientes. Se tienen 40 especies de mariposas registradas. El patrón de asentamiento dentro del Área es disperso, las comunidades tienen una población reducida y formada por quechuas que habitan los valles.

## 9 Parque Nacional y Territorio Indígena ISIBORO - SÉCURE

Ubicado entre los Departamentos del Beni (Provincia Moxos) y de Cochabamba (Provincia Chapare). Los municipios involucrados son San Ignacio de Moxos y Loreto en el Beni, y Villa Tunari y Morochata en Cochabamba. Tiene una superficie aproximada de 1.200.000 ha (12.000 km²). Desde 1990, esta Área tiene el doble estatus de Área Protegida y Territorio Comunitario de Origen (TCO). Colinda con otras TCOs: Yuracaré y Yuqui al Este, Territorio Indígena Chimán y Territorio Indígena Multétnico al Norte y es vecino a la TCO Moseténi al Oeste. El TIPNIS se caracteriza por su extraordinaria diversidad de ecosistemas en función a su amplio rango latitudinal. Alberga una gran diversidad biológica, con más de 800 especies de aves. Existen sitios arqueológicos de gran interés histórico. El clima varía según el gradiente latitudinal desde templado a frío en las partes altas hasta cálido en las tierras bajas. Las temperaturas medias anuales van desde los 15ºC en la serranía hasta los 32ºC en el pie de monte y la llanura boscosa (parte central), y 25ºC en la llanura o pampas de Moxos (parte Norte).

El rango altitudinal oscila entre los 3.000 y 180 msnm, con una altura promedio de 300 a 400 msnm. Presenta una variada fisiografía debido a su ubicación transicional entre las Serranías Subandinas y los Llanos de Moxos. La parte Sur y Oeste del Área es esencialmente montañosa y de abruptas pendientes e incluye las Serranías de Mosetenes y Sevaruyo con contrafuertes del Subandino. Las regiones Central y Sur están definidas por el relieve casi plano de la llanura aluvial de Moxos. La fisiografía del piso de monte y llanura aluvial del (TIPNIS) ha sido formada básicamente por los ríos Sécure, Isiboro, Isiborito y sus afluentes. Gran parte del Área soporta prolongadas inundaciones superficiales en la época lluviosa. Corresponde a las subregiones biogeográficas de Bosque Húmedo Montañoso, Yungas y Bosque Húmedo Tropical. Se registraron 402 especies de flora y se estima la existencia de 1.500 especies de plantas superiores. La extraordinaria diversidad florística incluye especies como el aliso, pino de monte, nogal, cedro, ceibo, palo maría y el tajibo. Se destacan las palmas como el asaí, las jatatas, y la palma real que forma extensos palmares en zonas inundadas de bosque. La fauna es igualmente muy diversificada registrándose a la fecha 714 especies. Destacan el jucumari, pejichi, marimono, manechi, londra, jaguar, ciervo de los pantanos, bufeo, tapir, peta de río, el caimán negro y aves endémicas.

El TIPNIS se caracteriza por una importante población de los grupos étnicos Moseténo, Yuracaré y Chimán.

## 10 Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado KAA-IYA DEL GRAN CHACO

Está ubicado en la región Sur del Departamento de Santa Cruz, en las Provincias Cordillera y Chiquitos. Los municipios involucrados son Charagua y Lagunillas. Tiene una ubicación fronteriza con el Paraguay. Su superficie es de 3.441.115 ha (34.411 km²). Constituye el Área Protegida de mayor extensión de Bolivia. Es también el Área Protegida de mayor tamaño de todo el Cono Sur. Su objetivo es proteger la muestra del ecosistema del Chaco Sudamericano. Incluye ecosistemas singulares del Chaco como el Bosque Seco Xerófilo. El clima es cálido, típico de regiones áridas y semiáridas con un promedio anual de lluvias de los 1.000 mm al Noreste hasta menos de 400 mm en el Suroeste. El rango altitudinal del Área oscila entre los 200 y 400 msnm. Ocupa gran parte de la extensa región fisiográfica conocida como la Llanura Chaqueña o Gran Chaco, caracterizada por su escaso relieve. La hidrografía está definida por la cuenca del río Parapetí. Se cuenta con información científica sobre las plantas vasculares, distribuidas en 111 familias y 26 especies de criptógamas. Sin embargo, se estiman 1.500 especies de plantas superiores.

Entre la flora destacan especies como el quebracho colorado, el soto negro, el cuchi, el guayacán morado, el guayacán negro y el cupesi.Otras especies importantes son: tobochi, algarrobillo, mistol y la palma blanca. La fauna del Área es representativa de la fauna chaqueña. Se registraron a la fecha unas 514 especies, 59 de grandes mamíferos, 301 aves, 69 de herpetofauna y 85 de micromamíferos. Entre las especies más destacables están: el tapir del Chaco, conocido como tagua o guilmero especie endémica del Chaco, los armadillos, endémicos de la región, la tortuga de tierra, el sachi-tuco. Se ha confirmado la presencia de guanaco en los alrededores de Santa Cruz del Arida. Tambien se encuentran el tropero, el armadillo endémico, pejichi, mono tití, marechi, gama o ciervo de las pampas, pava pintada, tucán, carpintero, urutau, nandú, pato negro y el pato crestudo. Otra los anfibios se señala la presencia del sapo de las salinas y del sapo chequeño gigante, y entre los reptiles la peta grande de monte, peta chica de monte, galápago negro y el lagarto o caimán. El patrón de asentamiento de las poblaciones es periférico con grupos indígenas (zoceño-Guaraní, Chiquitano y Ayoreo, además de algunos extranjeros que tienen sus propiedades al interior.

La administración se realiza a través de un convenio entre la CABI (Capitanía del Alto y Bajo Izozog) y el SERNAP.

## 11 Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado MADIDI

Se encuentra ubicado en la región Noreste del Departamento de La Paz, en las Provincias Franz Tamayo, José Ikurrala y Larecaja. Colinda al Oeste con la República de Perú. La superficie es de 1.895.750 ha (18.957 km²). El clima varía de frío (nevado) en la zona cordillerana, templado en las tierras intermedias montañosas hasta cálido en las tierras bajas del norte. La precipitación anual fluctúa alrededor de los 700 mm en las zonas altas y valles secos, y de los 1.800 mm en la llanura estacional, alcanzando niveles extraordinarios de pluviosidad (5.000 mm) en las serranías pluviales del Subandino. El rango altitudinal del Área es muy amplio, pectiando entre los 6.000 y los 200 msnm. El Área comprende una gran diversidad de ambientes fisiográficos, desde las altas cordilleras en la zona de Apolobambas hasta la llanura amazónica del río Heath, incluyendo en el gradiente una diversidad de regiones montañosas y del sistema Subandino. Biogeográficamente el Área corresponde a las subregiones de Puna, Bosque Húmedo Montañoso de Yungas y Bosque Húmedo del Madeira.

Es el área protegida con mayor diversidad de flora con 5.000 a 6.000 especies estimadas. Destacan especies como el palo maría, cedro, ceibo, iziqo, ocoqui, yuraj huaycha, pinos de monte, coca silvestre, aliso, chachacoani, yarumo, aliso colorado, amayán, limacho, ichilca, laureles, colorado de monte, quina, iziqo, bilka y el bibosi. Entre las palmas destaca las jatatas y la copa. Además, el Área alberga muchas especies de orquídeas incluyendo varias endémicas. Se registraron 204 especies de fauna, algunas de éstas amenazadas como: el jucumari, tunqui, águila de monteria, guáchero, marimono, puma, titi, gato andino o gato de pajonal, tarucu o venado andino, taitetú, pecarí o chancho de collar, jochi con cola, el jochi colorado, pava de monte, la pavita y varias especies de aves endémicas de la familia Tyrannidae y Furnariidae. La población es de origen Aymara en las tierras altas y campesino mestizo y migrantes Aymaras en los valles de Yungas, la población total es de aproximadamente 1.800 habitantes (alrededor de 250 familias).

## 12 Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica MANURIPI

Está ubicada al Sudoeste del Departamento de Pando y ocupa la parte de la Provincia Manuripi. La Reserva involucra a dos municipios, Puerto Rico y Filadelfia. Tiene una extensión de 747.000 ha (7.470 km²). La RNVS Amazónica Manuripi presenta zonas de gran belleza escénica de bosques, ríos y lagunas. Los ríos son aptos para la navegación comercial y de recreación. Entre los sitios con atractivos turísticos se puede mencionar el Lago Bay, ubicado a 111 km de la ciudad de Cobija, con aguas cristalinas en las que se puede apreciar una infinidad de peces, aves, lagartos y otras especies. El clima es tropical lluvioso y cálido estacional y presenta un gradiente de temperaturas medias de 26.2ºC al Sudeste y de 24.9ºC al Noroeste, las máximas medias llegando a 31ºC.

La precipitación media fluctúa de los 1.815 mm al Este hasta los 2.500 mm anuales al Oeste, con bajas precipitaciones en los meses de invierno. El rango altitudinal oscila entre los 126 y 269 msnm. El Área está ubicada en la región fisiográfica Pandino-Amazónica, en la periferia del Escudo Brasileño.

Presenta en toda su extensión un relieve suave y ondulado que corresponde a las planicies, llanuras y terrazas aluviales.

La Reserva está ubicada entre dos importantes ríos de la Amazonia, el Manuripi y el Madre de Dios. Pertenece a las sub-regiones biogeográficas Llanura Amazónica y Llanura Beniana. Corresponde en toda su extensión a sociaviana de Bosque Tropical Húmedo Amazónico. Son características de los bosques de terra firme: la castaña, ceiba, paiche, ochoó, amayán, mapajo, almendrillo, jichi, goma, mara macho, misa amarillo. Entre las palmas se encuentran: la palma real, varias especies de chonta, el mapajo, marfil vegetal, motacú y el asaí que está amenazado por la explotación comercial del palmito.

La fauna es diversa y típica de la Amazonia. Entre la fauna destacan especies como el jaguar, puma, tigrecillo, gato montés, zorro, sachi de río, pejichi, aliki, lagartija, chancho de tropa, chancho de monte, jochi, jochi pintado, huaso, urina y el caimán negro. Entre los primates se encuentran el mono aullador, mono negro o chichilo y otras especies de la familia Callitrichidae.

La población del Área se concentra en comunidades y barracas. La gran mayoría de las comunidades está ubicada en la carretera entre Filadelfia y Chivé, y dos se encuentran en los márgenes del río Madre de Dios. En total, en toda el área implementada de la Reserva se cuenta con una población de 1.800 habitantes. Sin embargo, estas cifras varían durante la zafra de la castaña por las migraciones estacionales de población.

## 13 Parque Nacional NOEL KEMPFF MERCADO




Ubicado en el Nordeste del Departamento de Santa Cruz, en la Provincia Velasco, y perteneciendo un sector al Este del Departamento del Beni, a la Provincia Iténez. Los municipios involucrados son San Ignacio de Velasco en Santa Cruz y Baures en el Beni. Colinda con el Brasil en su límite Este. La superficie es de 1.523.446 ha (15.234 km²). El PN Noel Kempff Mercado colinda al Oeste con la TCO Bajo Paraguá. El Área alberga una gran diversidad de ecosistemas, algunos de los cuales se destacan por su carácter único en Bolivia y por su estado de conservación. Además, el PN Noel Kempff Mercado presenta una excepcional belleza escénica caracterizada por los grandes farallones y cataratas de la meseta Caparu, formación única del Escudo Precámbrico en la zona. El clima es cálido tropical, con una precipitación pluvial anual promedio de 1.500 mm. El rango altitudinal oscila entre los 750 y 200 msnm. El Área ocupa la más importante región del sistema de serranías caracterizada por sus altas mesetas e impresionantes farallones.

Tiene una coadministración entre el SERNAP y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) desde 1995. Ha sido declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por UNESCO en el 2000. La fisiografía está definida por los ríos Iténez al Este y Paraguá al Oeste. Entre las ecoregiones presentes destaca el Bosque Húmedo Submontañoso del Escudo. Se registraron 2.700 especies de plantas superiores, pero se estima que podrían existir cerca de 4.000 especies de plantas superiores. La flora del Área destaca la tipa, cedro, ceibo, cedro, gomo, especies de palmas como el asaí, motacú/ojo, jachuva y la palma real. El Área se caracteriza por una diversidad de especies de orquídeas y por las comunidades florísticas típicas del Cerrado. Se registraron 1.196 especies de fauna. Destaca un conjunto de especies silvestres que se encuentran amenazadas en otras regiones del país como: el ciervo de los pantanos, gama, jaguar, lignecillo, mono tití, paraba siete colores, taitanuje y el caimán. La avifauna es muy rica y particular, estimándose más de 600 especies. Existen reportes de la presencia de jaguares melánicos (jaguar negro o pantera). El PN N. K. merecido se caracteriza por su escaso poblamiento, salvo dos pequeñas comunidades que se encuentran dentro del área. La mayor parte de la población está asentada en la zona de amortiguación externa al Oeste del río Paraguá.

## 14 Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado OTUQUIS

La región tiene la característica de presentar un mosaico de llanuras de inundación, con grandes concentraciones de fauna silvestre, las llanuras están interrumpidas por inmensas bajas y aisladas del Chaco, y una pequeña emergencia que da el nombre del Escudo Chiquitano. Se ubica en el Sudeste del Departamento de Santa Cruz, en las provincias Germán Busch y Cordeno. El Área está dividida en dos sectores: el más grande al Sur involucra los municipios de Puerto Suárez y Puerto Quijarro y una parte más pequeña llamada Río Pimiento, al Norte de la ciudad de Puerto Suárez. El Área colinda al Sur con la República del Paraguay y al Este con la República de Brasil. Tiene una superficie total de 1.005.950 ha (10.059 km²). El clima del Pantanal de Otuquis es de tipo subtropical amazónico. La temperatura media anual oscila entre 21ºC (mínima) y 31ºC (máxima) en promedio. El Área tiene una precipitación promedio anual de 1.151 mm. El rango altitudinal oscila entre los 80 y 180 msnm.

El Área pertenece a las unidades fisiográficas de las Llanuras del Chaco, el Escudo Brasileño y las Sierras Chiquitanas.

La red hidrográfica al interior del Área no posee un patrón definido de distribución, asemejándose más bien a una red de drenaje.

Se han identificado 9 formaciones vegetales que corresponden a Bosque Siempre Verde, Bosque Semidecíduo y Bosque Deciduo, Bosque Alto Semidecíduo y Subhúmedo de Llanura, Bosque Semidecíduo Hidrófilo, palmares de caranda, cunichos o canales pantanosos, Matorral Chaqueño, Bosque Bajo Ripario, vegetación acuática, pastizales de sabana.

Entre las especies de flora sobresalientes se puede mencionar, el cuchi, tajibo, ochoó/ojo, curupau, ajoromoco, cedro, ajo-ajo, bibosi, palmares de caranda y el motacú. En lo que se refiere a la fauna se han registrado 59 especies de mamíferos y el Área se caracteriza por una alta diversidad de aves, se han observado concentraciones de grandes aves acuáticas. Hasta la fecha se han estudiado en dos sectores, el más grande al Sur involucra los municipios de Puerto Suárez y Puerto Quijarro y una parte más pequeña llamada Río Pimiento, al Norte de la ciudad de Puerto Suárez. El Área colinda al Sur con la República del Paraguay y al Este con la República de Brasil. Tiene una superficie total de 1.005.950 ha (10.059 km²). El clima del Pantanal de Otuquis es de tipo subtropical amazónico. La temperatura media anual oscila entre 21ºC (mínima) y 31ºC (máxima) en promedio. El Área tiene una precipitación promedio anual de 1.151 mm. El rango altitudinal oscila entre los 80 y 180 msnm.

## 15 Reserva de Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen PILÓN LAJAS

Ocupa la región Suroeste del Departamento del Beni y Centro Este del Departamento de La Paz, en las Provincias Ballivián (Beni) y Sud Yungas, Franz Tamayo (La Paz). Tiene una superficie de 400.000 ha (4.000 km²). El clima es mayormente cálido y muy húmedo. Los niveles de precipitación anual fluctúan entre los 1.600 y 4.000 mm, dependiendo de la ubicación fisiográfica de las zonas. El rango altitudinal oscila entre los 3.000 y 250 msnm. Se encuentra ubicada en la región fisiográfica del Subandino Norte en transición a la Llanura Aluvial del Beni. Las serranías Beu, Chepite, Muchanes y Bela surcan el Área en franjas paralelas con dirección Sudeste – Noroeste y flanquean el amplio valle aluvial y pedregoso del río Quiquibey. La hidrografía está definida principalmente por la subcuenca del río Quiquibey. Se encuentra en las subregiones biogeográficas de Bosque Húmedo Montañoso de Yungas y del Bosque Húmedo del Madeira.

Al ubicarse en el Subandino Pluvioso posee una alta diversidad de ecosistemas entre los que destacan el Bosque Nublado de Ceja, el Bosque Pluvial Siempre Verde y el Bosque Húmedo Pedemontano, el Bosque Húmedo Estacional Aluvial, Bosques Ribereños y Palmares pertenecen de la palma real, además de sabanas edáficas (en función al sustrato geológico) en las crestas de algunas serranías. Se tienen 624 especies registradas de flora y se estima la existencia de 2.500 especies de plantas superiores.

En la flora se encuentra una gran diversidad de especies de palmeras entre las cuales destacan la pachiuva, copa, motacú, varias chontas, palmas, la palma real, jatata y palma de jipi japa importantes las especies de madera valiosa como la mara, cedro, ceibo, tajibo, especies de uso comercial como el palo maría, tajibo y la jatata. Se tienen registradas 748 especies de fauna. Destacan el jaguar, puma, marimono, pejichi, manechi, pelo negro, peta de río y el caimán negro. Existen reportes de la presencia del jucumari en las serranías altas de Muchanes y de la harpía. Se estiman para el Área más de 700 especies de aves, 69 especies de anfibios registradas. La población del Área se concentra en determinados sitios de colonización a lo largo de ejes viales, mayormente Chinchamani, Mosetén y Tacana, asentados en 23 comunidades y asentamientos dispersos compuestos por